Opublikowano na *Miasto Hrubieszów* (https://www.miasto.hrubieszow.pl)

Groźny szkodnik jesionów wykeyty w pobliżu Polski

07.08.2026
Pozostałe

Na terytorium Unii Europejskiej po raz pierwszy wykryto priorytetowego agrofaga kwarantannowego – Agrilus planipennis (opiętek jesionowiec).

Szkodnik został stwierdzony na Węgrzech oraz na Słowacji, około 100 km od południowej granicy Polski, co zwiększa ryzyko jego pojawienia się w naszym kraju.

Opiętek jesionowiec (niebieskozielony z metalicznym połyskiem chrząszcz o dł. ok. 8,5 – 14 mm) jest jednym z najgroźniejszych szkodników jesionów na świecie. Larwy (białokremowe o dł. ok. 26 – 32 mm) rozwijają się pod korą drzew, uszkadzając tkanki przewodzące i prowadząc do stopniowego zamierania drzew.

WIORiN w Lublinie apeluje o zwracanie uwagi na objawy mogące świadczyć o obecności szkodnika, takie jak:

- otwory wylotowe w kształcie litery „D”;
- chodniki larwalne pod korą;
- zamieranie koron i wierzchołków jesionów;
- pękająca kora pni i gałęzi.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych objawów lub owadów prosimy o ich niezwłoczne zgłoszenie do WIORiN w Lublinie lub najbliższego oddziału.

Wykaz oddziałów dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wiorin-lublin/oddzialy2 [1]

Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskich

jesionów, podjęcie skutecznych działań zwalczających oraz ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

tel: 81 744 03 26,
email: wi-lublin@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie


GROŹNY SZKODNIK JESIONÓW WYKRYTY W POBLIŻU POLSKI



Na terytorium Unii Europejskiej po raz pierwszy wykryto priorytetowego agrofaga kwarantannowego – **Agrilus planipennis (opiętek jesionowiec)**

- szkodnik został stwierdzony na Węgrzech oraz na Słowacji, około **100 km od** południowej granicy **Polski**, co zwiększa ryzyko jego pojawienia się w naszym kraju
- opiętek jesionowiec (niebieskozielony z metalicznym połyskiem o o dł. ok. 8,5 – 14 mm) jest jednym z **najgroźniejszych szkodników jesionów na świecie**. Larwy (białokremowe o dł. ok. 26 – 32 mm) r się pod korą drzew, uszkadzając tkanki przewodzące i prowadząc stopniowego zamierania drzew

WIORiN w Lublinie apeluje o zwracanie uwagi na objawy ś świadczyć o obecności szkodnika, takie jak:



- otwory wylotowe w kształcie litery „D”
- chodniki larwalne pod korą
- zamieranie koron i wierzchołków jesionów
- pękająca kora pni i gałęzi

W przypadku zaobserwowania podejrzanych objawów lub o prosimy o ich niezwłoczne zgłoszenie do WIORiN w Lublinie najbliższego oddziału.

Wykaz oddziałów dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/wiorin-lublin/oddzialy2

Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znacze